



PROTOCOLO DE VACUNACIÓN FRENTE A VPH EN MUJERES QUE HAN SUFRIDO UN TRATAMIENTO ESCISIONAL POR LESIONES CERVICALES PRENEOPLÁSICAS.

ANTECEDENTES

El riesgo de recurrencias de lesiones intraepiteliales neoplásicas CIN2+, bien por reinfección o por reactivación en mujeres que han sufrido un proceso excisional en el cuello uterino es 4-5 veces mayor que en la población general, y que suelen aparecer en los tres primeros años tras la cirugía¹.

Aunque no se dispone de ensayos clínicos controlados y aleatorios “ad hoc”, sí existen fundamentadas evidencias de que la vacunación de mujeres que han sido sometidas a un tratamiento de ese tipo reduce sensiblemente el riesgo de recurrencias, tanto con la vacuna tetravalente^{2,3}, como para la bivalente⁴.

CRITERIOS PARA LA VACUNACIÓN

Las mujeres candidatas a recibir la pauta de vacunación serán:

- Aquellas programadas para un proceso excisional o las que ya lo hayan sufrido (en este caso siempre que haya transcurrido menos de un año entre el tratamiento y la solicitud de vacunación) por CIN2+ o por adenocarcinoma *in situ* (AIS), y que además:
a) les haya sido practicada una determinación previa de infección por oncotipos de VPH mediante test de captura de híbridos, y b) se sometan a un seguimiento posterior mediante citología y determinación de VPH.

¹ Iversen O. Recurrent high-grade cervical lesion after primary conisation is associated with persistent HPV infection. 28th International Papillomavirus Conference. November 30-December 6, 2012. San Juan. Puerto Rico

² Joura E et al. Effect of the human papillomavirus quadrivalent vaccine in a subgroup of women with cervical and vulvar disease: retrospective pooled analysis of trial data. *Br Med J* 2012;344:e1401.

³ Kang W et al. Is vaccination with quadrivalent HPV vaccine after loop electrosurgical excision procedure effective in patients with high-grade cervical intraepithelial neoplasia (CIN 2-3). *Gynecol Obstet* 2013;130:264-268

⁴ Garland S. Does the HPV-16-18 AS04 adjuvanted vaccine benefit women with cervical disease? EUROGIN. Lisbon. Portugal. May 8-11, 2011



PETICIÓN DE LA VACUNA

Las dosis de vacuna serán proporcionadas por el Programa de Vacunaciones previa presentación del pertinente informe clínico en el que se explicitarán los requisitos anteriores.

DIRECCIONES DEL PROGRAMA DE VACUNACIONES

- Servicio de Prevención y Protección de la Salud. Consejería de Sanidad, Ronda de Levante 11, 2º piso, 30008, Murcia: 968 362 249
- Dirección de Salud del Área de Cartagena (Áreas II y VIII): Pza. de San Agustín, 3, 30201. Cartagena: 968 326 676
- Dirección de Salud del Área de Lorca (Área III). Abad Los Arcos, 1. 30801. Lorca: 968 444 749