

VACUNACIÓN ANTINEUMOCÓCICA EN PERSONAS CON CONDICIONES DE RIESGO DE CUALQUIER EDAD

CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO <24 MESES DE EDAD

2-6 MESES DE EDAD

0 DOSIS VNC13

3 dosis VNC20 (intervalo recomendado de 8 semanas*) + 1 dosis a partir de los 11 meses (intervalo mínimo de 8 semanas desde la dosis anterior).

1 DOSIS VNC13

2 dosis (intervalo recomendado de 8 semanas*) + 1 dosis a partir de los 11 meses (intervalo mínimo de 8 semanas desde la dosis anterior).

2 DOSIS VNC13

1 dosis + 1 dosis a los 11 meses.

7-11 MESES DE EDAD

0 DOSIS VNC13

2 dosis (intervalo recomendado de 8 semanas*) + 1 dosis en el 2º año de vida (intervalo mínimo de 8 semanas desde la dosis anterior).

1 DOSIS VNC13

1 dosis + 1 dosis en el segundo año de vida (intervalo mínimo de 8 semanas desde la dosis anterior).

2 DOSIS VNC13

1 dosis a los 11 meses.

12-23 MESES DE EDAD

0 DOSIS VNC13

2 dosis (intervalo mínimo de 8 semanas).

1-2 DOSIS VNC13

1 dosis.

INICIAR AL MENOS 8 SEMANAS TRAS LA ÚLTIMA DOSIS DE VACUNA ANTINEUMOCÓCICA CONJUGADA RECIBIDA.

*Intervalo mínimo de 4 semanas entre dosis.

- Enfermedad cardiovascular crónica.
- Enfermedad respiratoria crónica, incluida asma y fibrosis quística.
- Diabetes mellitus.
- Enfermedad celiaca.
- Hepatopatía crónica y alcoholismo crónico.
- Enfermedad neurológica y neuromuscular o trastornos que dificulten la movilización de secreciones respiratorias o aumenten el riesgo de aspiración.
- Antecedente de ENI.
- Patología pulmonar confirmada tras padecimiento de COVID-19.
- Institucionalizados.
- Fístula de LCR e implante coclear (o en espera de realizarlo).
- Hemopatías malignas.
- Cáncer en tratamiento con QT o RT.
- Asplenia anatómica o funcional y tratamiento con eculizumab e inhibidores del complemento.
- Inmunosupresión 2aria a tratamiento.
- Inmunodeficiencia 1aria.
- Infección por VIH.
- Insuficiencia renal crónica avanzada, síndrome nefrótico y diálisis.
- Trasplante de órgano sólido.
- Síndrome de Down.

CONDICIONES DE RIESGO ≥24 MESES DE EDAD SIN INMUNOSUPRESIÓN

NO VACUNACIÓN PREVIA

Una dosis de VNC20.

VACUNACIÓN CON UNA DOSIS DE VNP23 ≥24 MESES DE EDAD

Correctamente vacunado.

VACUNACIÓN CON PAUTA COMPLETA DE VNC13 SEGÚN LA EDAD

Una dosis de VNC20:

- 2-17 años. Intervalo de 8 semanas tras dosis anterior.
- ≥18 años. Intervalo de 1 año tras dosis anterior.

- Enfermedad cardiovascular crónica.
- Enfermedad respiratoria crónica, incluida asma y fibrosis quística.
- Diabetes mellitus.
- Enfermedad celiaca.
- Hepatopatía crónica y alcoholismo crónico.
- Enfermedad neurológica y neuromuscular o trastornos que dificulten la movilización de secreciones respiratorias o aumenten el riesgo de aspiración.
- Antecedente de ENI.
- Patología pulmonar confirmada tras padecimiento de COVID-19.

INSTITUCIONALIZADOS ≥24 MESES DE EDAD

NO VACUNACIÓN PREVIA

Una dosis de VNC20.

VACUNACIÓN CON PAUTA COMPLETA DE VNC13 SEGÚN EDAD SIN VNP23

Una dosis de VNC20:

- 2-17 años. Intervalo de 8 semanas tras dosis anterior.
- ≥18 años. Intervalo de 1 año tras dosis anterior.

VACUNACIÓN PREVIA CON UNA O DOS DOSIS DE VNP23 SEPARADAS POR 5 AÑOS <65 AÑOS

Una dosis de VNC20 con un intervalo de 5 años desde dosis anterior.

VACUNACIÓN PREVIA CON DOS DOSIS DE VNP23 SEPARADAS POR 5 AÑOS, HABIENDO RECIBIDO LA ÚLTIMA DOSIS ≥65 AÑOS

Correctamente vacunado.

VACUNACIÓN CON PAUTA COMPLETA DE VNC13 SEGÚN EDAD + VNP23 (DOSIS ÚNICA O CON RECUERDO DE 5 AÑOS)

Correctamente vacunado.

CONDICIONES DE RIESGO ≥24 MESES DE EDAD CON INMUNOSUPRESIÓN*

NO VACUNACIÓN PREVIA

Una dosis de VNC20.

VACUNACIÓN CON PAUTA COMPLETA DE VNC13 SEGÚN EDAD SIN VNP23

Una dosis de VNC20:

- 2-17 años. Intervalo de 8 semanas tras dosis anterior.
- ≥18 años. Intervalo de 1 año tras dosis anterior.

VACUNACIÓN CON VNP23 SIN VNC13

Una dosis de VNC20 ≥1 año desde la última dosis recibida.

VACUNACIÓN CON PAUTA COMPLETA DE VNC13 SEGÚN EDAD + VNP23 (DOSIS ÚNICA O CON RECUERDO DE 5 AÑOS)

Una dosis de VNC20 ≥5 años tras la última dosis recibida

- Fístula de LCR e implante coclear (o en espera de realizarlo).
- Hemopatías malignas.
- Cáncer en tratamiento con QT o RT.
- Asplenia anatómica o funcional y tratamiento con eculizumab e inhibidores del complemento.
- Inmunosupresión 2aria a tratamiento.
- Inmunodeficiencia 1aria.
- Infección por VIH.
- Insuficiencia renal crónica avanzada, síndrome nefrótico y diálisis.
- Trasplante de órgano sólido.
- Síndrome de Down.

*POR SU MAYOR RIESGO DE ENI, LA FÍSTULA DE LCR Y EL IMPLANTE COCLEAR SIGUEN LA MISMA PAUTA VACUNAL QUE LOS INMUNODEPRIMIDOS.

TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS (TPH)

NO VACUNACIÓN TRAS TPH

4 dosis de VNC20 (3 dosis separadas por al menos 4 semanas, comenzando a los 3-6 meses del trasplante, y cuarta dosis al menos 6 meses tras la tercera dosis, siempre que hayan pasado al menos 12 meses del TPH).

VACUNACIÓN CON 3 DOSIS DE VNC13 TRAS TPH SIN VNP23

Una dosis de VNC20 sustituyendo la dosis VNP23.

VACUNACIÓN CON PAUTA COMPLETA DE VNC13 TRAS TPH + VNP23 (DOSIS ÚNICA O CON RECUERDO DE 5 AÑOS)

Correctamente vacunado.