

## الأم الحاملة لفيروس التهاب الكبد من النوع B. وثيقة معلومات ما بعد الشفاء

العائلة العزيزة، من خلال هذه الوثيقة، نود أن نعلمك أنه خلال إقامتك في مركزنا تلقى طفلك الجرعة الأولى من لقاح التهاب الكبد B، بالإضافة إلى جرعة محددة من الغاما جلوبيولين المضاد لفيروس التهاب الكبد B في نفس الوقت. تم تطبيق هذا اللقاح في أول 12 ساعة من الحياة، وفقاً للتوصيات الموضوعة للوقاية من انتقال فيروس التهاب الكبد B في الفترة المحيطة بالولادة.

نود أن نعلمك أنه، لإجراء التحصين المناسب لطفلك، من المستحسن أن يتلقى ثلاث جرعات إضافية (مدرجة في اللقاح سداسي التكافؤ الذي يتم إعطاؤه في عمر 2 و 4 و 11 شهراً)، وفقاً لتقويم التطعيم مدى الحياة المعمول به في منطقة مرسية (<https://www.murciasalud.es/web/vacunacion/calendarios-de-vacunacion>). سوف تتلقون المزيد من المعلومات في هذا الصدد في مركزكم الصحي.

إذا كنت قد قررت إرضاع طفلك/طفلتك بحليب الثدي، فيجب أن تعلمي أن كونك حاملاً لفيروس التهاب الكبد B لا يتعارض مع الرضاعة الطبيعية، حيث لا توجد أي مشكلة في هذا السياق بالنسبة لك للقيام بذلك.

أخيراً، نحيطكم علماً أنه باتباع جدول التطعيمات هذا، يتم الحد من خطر انتقال العدوى إلى الحد الأدنى. على أية حال، يُنصح بإجراء تحديد مصلي في مركزك الصحي يتضمن التهاب الكبد من النوع HBsAg وHBsAC عند عمر عام تقريباً (1-3 أشهر بعد لقاح الـ11 شهراً) للتحقق من عدم حدوث أي انتقال للفيروس وكذلك وجود استجابة كافية للأجسام المضادة بعد التطعيم.

نرجو تقديم هذه الوثيقة عند الفحص الأول مع طبيب الأطفال الخاص بك في مركزك الصحي من أجل القيام بالمراقبة المناسبة لابنك/ابنتك.

نعتنم هذه الفرصة لتهنئتك على أمومتك الحديثة.

تحية طبية

خدمة الصحة بمرسية  
برنامج التحصين