



Programa de mujeres conizadas ¿Cómo perciben las mujeres conizadas las reacciones postvacunales con VPH?

Cayuela Fuentes JM, Sánchez Manresa S, Fernández Puerta MF, Martínez Martínez MI, Navarro Alonso JA, Bernal González PJ, Pérez Martín JJ, Fernández Sáez L.
correo de contacto: juanam.cayuela@carm.es.

Introducción y Objetivo

Durante el año 2015, el Programa de Vacunaciones continuó con la vacunación frente al VPH a mujeres que precisaron una conización por lesiones de alto grado y que retiraron las dosis de vacuna en los Servicios Centrales y en la Dirección de Área de Lorca.

Con este estudio queremos conocer: las reacciones postvacunales que tuvieron y su percepción ante las mismas, así como el nivel de satisfacción en la atención recibida por los profesionales del Programa de Vacunaciones.

Material y métodos

Tipo Estudio: Descriptivo retrospectivo. **Periodo:** año 2015.

Fuente información: Registro de mujeres conizadas Región de Murcia, elaborado por el Servicio de Prevención y Protección de la Salud. Encuesta realizada “ad hoc” de 13 ítems a las usuarias sobre los objetivos a estudiar.

Sujeto: Mujeres que han sufrido un tratamiento escisional que cumplen los criterios requeridos según protocolo y que acuden al Servicio de Prevención y Protección de la Consejería de Salud y a la Dirección de Área de Lorca. Durante el mes de junio de 2016 se realizó la encuesta telefónica por dos personas ajenas al Servicio y con un guión ya elaborado.

Se realizó un **análisis descriptivo** mediante porcentajes de las variables a estudio.


Zonas de Salud pertenecientes a cada Dirección Área Salud Pública



173 mujeres




133 mujeres




Resultados

- La edad promedio de las mujeres encuestadas fue de 35,44 años, siendo la más joven de 21 y la de más edad de 60 años.
- 126 mujeres (94,7%) han completado pauta, 6 (4,5%) llevan dos dosis y sólo 1 mujer lleva una dosis puesta.
- En cuanto a los motivos para no completar pauta: 5 mujeres se quedaron embarazadas, 1 por histerectomía y otra por miedo a las reacciones adversas.
- 52 mujeres (39%) sí han traído el resultado de la biopsia. Al resto se le ha ofrecido la posibilidad de enviarla por correo electrónico o por fax al Servicio. De los oncotipos identificados (69 registros) el más frecuente es el 16 (57%), seguido del 31 con un 12%.
- 100 mujeres (75,2%) refirieron no presentar ningún síntoma y sólo 33 manifestaron que la vacuna les provocó algún efecto adverso, precisando 14 de ellas tratamiento farmacológico (93% tomaron paracetamol).
- A 12 mujeres las reacciones adversas les impidieron realizar sus actividades diarias.


- De todas las encuestadas, 85 mujeres contestaron afirmativamente a una o más reacciones adversas, siendo las más frecuentes dolor en el lugar de inyección (68), inflamación local (38) y debilidad o malestar general (12). La menos frecuente fue dolor muscular o articular (3).



- En relación a la satisfacción de las mujeres sobre el trato recibido por parte de Enfermería: el 89% de las mujeres han puntuado por encima del 9 y el 10% entre 7-8 puntos.



- 18 mujeres han aportado sugerencias: 50% proponen facilitar el acceso a la vacuna (dispensarlas en el Centro de Salud y horarios más flexibles) y el 33% disponer de más información desde el hospital que realiza la conización y en un lenguaje más comprensible.



Conclusiones

1. La vacunación frente a VPH por este colectivo fue percibida como “segura” (el 75,2% respondieron que no tuvieron síntomas), a pesar de que algunas mujeres tuvieron reacciones adversas de carácter leve.
2. Los efectos adversos más frecuentes son los que están recogidos en ficha técnica (dolor o inflamación en el lugar de inoculación).
3. La actuación de Enfermería del Programa de Vacunaciones ha sido percibida con una alta satisfacción, aunque proponen mejorar el acceso a la vacuna y la información recibida desde el hospital.